

Рекомендации пациенту после эндодонтического лечения зубов

Сегодня Вам проводили эндодонтическое лечение зуба. Лечение корневых каналов – это серьезное стоматологическое вмешательство, позволяющее сохранить зуб. Оно заключается в удалении инфицированных тканей из канала, механической, медикаментозной, ультразвуковой обработки каналов и пломбировании канала(ов) лечебным(временным) или постоянным материалом. Чтобы лечение прошло наиболее комфортно, необходимо соблюдать рекомендации Вашего лечащего врача:

1. Эндодонтическое лечение чаще проводится под обезболиванием. Онемение на верхней челюсти может длиться в течение 1-2 часов, на нижней челюсти значительно дольше, в течение 2 -4 часов, в зависимости от ваших анатомических особенностей. Постарайтесь в это время не принимать пищу, чтобы не повредить (прикусить) мягкие ткани щеки, языка, губ.
2. После прекращения действия анестезии могут возникнуть ноющие боли и(или) болезненность при надкусывании на зуб . Это связано с естественной биологической реакцией организма на вмешательство и наличие лечебного или пломбировочного материала в канале(ах) зуба, а так же зависит от степени уже имеющегося на момент вашего обращения воспаления в тканях, окружающих корни. Эти ощущения могут сохраняться на протяжении нескольких суток. Рекомендуем на этот период: ограничить жевательную нагрузку на пролеченный зуб

при необходимости можно принять болеутоляющие средства, рекомендованного врачом, если боль усиливается, появляется отек, поднимается температура, необходимо немедленно обратиться к лечащему врачу по телефонам, указанным в памятке.

3. Нельзя греть зуб!

4. После эндодонтического лечения зуб может быть покрыт временной пломбой-повязкой. Рекомендуем не употреблять пищу на протяжении первых 2-х часов после лечения до ее полного отвердения, а также уменьшить жевательную нагрузку на пролеченный зуб в течение всего периода лечения. Пломба-повязка может незначительно крошиться при жевании и может ощущаться непривычный привкус во рту. Если временная пломба выпала, необходимо обратиться к лечащему врачу, чтобы предотвратить скол стенки зуба и инфицирования каналов.

5. После проведенного эндодонтического лечения, зуб ослаблен. Для исключения образования сколов, трещин, перелома зуба, что по абсолютным медицинским показаниям потребует удаления, рекомендуется восстановление зуба постоянной ортопедической конструкцией (коронкой) в сроки не более 1 месяца после постоянной пломбировки корневых каналов. Это позволит герметично закрыть доступ к корневым каналам, предотвратить их повторное инфицирование, укрепить ослабленные стенки зуба, полностью восстановить форму зуба и функцию жевания в целом.

Мы желаем ВАМ Здоровья! т.604-72-32

Узнавайте первыми про наши акции, конкурсы и специальные предложения



Мы в VK



Мы в INSTAGRAM